

GeloTonsil®

Gurgelgel

GeloTonsil® Gurgelgel enthält: Xanthan und Natriumhyaluronat
Weitere Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Xylitol, Dexpanthenol, Dinatriumhydrogen-phosphat, Citronensäure, Wasserstoffperoxid und Sucralose

Inhalt: 200 ml

Anwendungsgebiet:

GeloTonsil® Gurgelgel dient der unterstützenden Therapie von Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Halsschmerzen und Schluckbeschwerden werden gelindert, indem sich GeloTonsil® Gurgelgel als ein Schutzfilm auf die gereizte Rachenschleimhaut legt.

Wirkprinzip:

GeloTonsil® Gurgelgel wirkt physikalisch. Beim Gurgeln legt sich das viskose Gurgelgel als ein Schutzfilm auf die Mund- und Rachenschleimhaut und befeuchtet diese. Durch die Befeuchtung wird die Mund- und Rachenschleimhaut vor Austrocknung, Reizungen und äußeren Einflüssen, die Halsschmerzen verursachen können, geschützt. Die gereizte und entzündete Rachenschleimhaut wird durch die Anwendung von GeloTonsil® Gurgelgel gespült, wodurch Erreger von Halsschmerzen, vor allem Viren, mechanisch entfernt werden. Durch die gelbildenden Bestandteile Xanthan und Hyaluronsäure legt sich ein schützender Gelfilm auf die entzündete Schleimhaut, beruhigt sie und bewahrt sie vor weiteren äußeren Einflüssen. Die in GeloTonsil® Gurgelgel enthaltene Hyaluronsäure erhöht das Feuchthaltevermögen und verstärkt die Anhaftung des Schutzfilms auf den Schleimhäuten. Zusätzlich ist Dexpanthenol als pflegender Bestandteil enthalten. Gereizte Bereiche können sich wieder regenerieren.

Gegenanzeigen und Hinweise:

GeloTonsil® Gurgelgel darf bei bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile nicht angewendet werden. Bitte verwenden Sie GeloTonsil® Gurgelgel nicht gleichzeitig mit anderen in Mund und Rachen anzuwendenden Mitteln. Bitte verwenden Sie GeloTonsil® Gurgelgel nur, wenn Sie sicher gurgeln können. Augenkontakt ist zu vermeiden. GeloTonsil® Gurgelgel enthält keinen Alkohol und ist frei von tierischen Bestandteilen.

FR **Notice d'instruction**

GeloTonsil®

Gel pour gargarisme

Le gel pour gargarisme GeloTonsil® contient : du xanthane et du hyaluronate de sodium

Autres ingrédients : eau purifiée, xylitol, dexpanthénol, hydrogénophosphate de sodium, acide citrique, peroxyde d'hydrogène et sucralose

Contenu : 200 ml

Indication thérapeutique :

Le gel pour gargarisme GeloTonsil® est un traitement d'appoint des inflammations de la muqueuse buccale et pharyngée. Les maux de gorge et les difficultés de déglutition sont soulagés par le film protecteur déposé sur la muqueuse irritée de la gorge par le gel pour gargarisme GeloTonsil®.

Mécanisme d'action :

Le gel pour gargarisme GeloTonsil® exerce une action physique. Lors des gargarismes, le gel visqueux dépose un film protecteur sur la muqueuse de la bouche et de la gorge et l'humidifie. Cette hydratation protège la muqueuse buccale et pharyngée contre la déshydratation, l'irritation et les agressions externes pouvant causer des maux de gorge. La muqueuse irritée et inflammée est nettoyée par le gel pour gargarisme GeloTonsil® qui élimine mécaniquement les pathogènes responsables des maux de gorge, surtout les virus. Grâce aux propriétés gélifiantes du xanthane et de l'acide hyaluronique, un film de gel

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden. Kinder ab 3 Jahren sollten GeloTonsil® Gurgelgel nur anwenden, wenn sie sicher gurgeln können.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

GeloTonsil® Gurgelgel darf während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Was ist sonst bei bestimmten Patientengruppen zu beachten?

GeloTonsil® Gurgelgel ist zuckerfrei und für Diabetiker geeignet.

Nebenwirkungen:

Für GeloTonsil® Gurgelgel sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Art und Dauer der Anwendung:

GeloTonsil® Gurgelgel ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt zum Gurgeln verwendet. Verwenden Sie zum Abmessen einen Esslöffel. Mit unverdünntem GeloTonsil® Gurgelgel etwa 30 Sekunden lang gurgeln. Danach spucken Sie GeloTonsil® Gurgelgel aus und spülen nicht nach. Ein unbeabsichtigtes Verschlucken kleinerer Mengen von GeloTonsil® Gurgelgel ist unbedenklich.

Wie oft sollten Sie GeloTonsil® Gurgelgel anwenden?

Die empfohlene Menge zum Gurgeln beträgt 3 x täglich 1 Esslöffel (10-15 ml). Vermeiden Sie Essen oder Trinken für etwa eine Stunde nach der Anwendung, damit der Schutzfilm optimal anhaftet.

Wie lange können Sie GeloTonsil® Gurgelgel anwenden?

GeloTonsil® Gurgelgel soll bis zum Abklingen der Beschwerden über mehrere Tage angewendet werden. Sollten sich Ihre akuten Beschwerden verschlimmern (z. B. Fieber, Halsschwellung, Gliederschmerzen) oder nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:

Verwenden Sie GeloTonsil® Gurgelgel nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums. Bitte verwenden Sie GeloTonsil® Gurgelgel nach Anbruch nicht länger als 14 Tage.

Aufbewahrungshinweis:

GeloTonsil® Gurgelgel ist unter 25 °C aufzubewahren.

Medizinprodukte sorgfältig aufbewahren! Vor Kindern sichern!

protecteur se dépose sur la muqueuse irritée, l'apaise et la protège contre d'autres agressions extérieures. L'acide hyaluronique contenu dans le gel pour gargarisme GeloTonsil® augmente la capacité des muqueuses à retenir l'eau et renforce l'adhérence du film protecteur sur les muqueuses. Le gel contient également du dexpanthénol, un ingrédient nutritif. Les zones irritées peuvent ainsi se régénérer.

Contre-indications et précautions d'emploi :

Le gel pour gargarisme GeloTonsil® ne doit pas être utilisé en cas d'allergie ou d'hypersensibilité connue à l'un des composants. Ne pas utiliser le gel pour gargarisme GeloTonsil® avec d'autres produits à utiliser dans la bouche et la gorge. N'utilisez le gel pour gargarisme GeloTonsil® que si vous pouvez vous gargariser de manière sûre. Évitez tout contact avec les yeux. Le gel pour gargarisme GeloTonsil® ne contient ni alcool ni ingrédients d'origine animale.

De quoi faut-il tenir compte chez les enfants ?

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. Les enfants de plus de 3 ans ne doivent utiliser le gel pour gargarisme GeloTonsil® que s'ils sont en mesure de se gargariser de manière sûre.

Grossesse et allaitement :

Le gel pour gargarisme GeloTonsil® peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

De quoi faut-il en outre tenir compte chez certains groupes de patients ?

Le gel pour gargarisme GeloTonsil® est sans sucre et indiqué pour les diabétiques.

Effets indésirables :

Aucun effet indésirable n'est connu pour le gel pour gargarisme GeloTonsil®.

Mode et durée d'utilisation :

Le gel pour gargarisme GeloTonsil® est prêt à l'emploi et s'utilise non dilué pour se gargariser. Utilisez une cuillère à soupe pour doser le gel. Gargarisez-vous avec le gel pour gargarisme GeloTonsil® non dilué pendant environ 30 secondes. Ensuite, recrachez le gel pour gargarisme GeloTonsil® et ne vous rincez pas la bouche. L'absorption accidentelle d'une faible quantité de gel pour gargarisme GeloTonsil® est inoffensive.

À quelle fréquence utiliser le gel pour gargarisme GeloTonsil® ?

La quantité recommandée pour les gargarismes est d'une cuillère à soupe (10-15 ml) 3 fois par jour. Évitez de boire ou de

manger pendant environ une heure après l'utilisation pour obtenir une adhérence optimale du film protecteur.

Pendant combien de temps utiliser le gel pour gargarisme GeloTonsil® ?

Le gel pour gargarisme GeloTonsil® doit être utilisé pendant plusieurs jours jusqu'à disparition des symptômes. Si vos symptômes aigus s'aggravent (par ex. fièvre, congestion de la gorge, douleurs articulaires) ou en l'absence d'amélioration dans les 3 jours, consultez votre médecin.

Informations et données relatives à la durée de conservation :

Ne pas utiliser le gel pour gargarisme GeloTonsil® au-delà de la date de péremption.

Ne pas utiliser le gel pour gargarisme GeloTonsil® plus de 14 jours après ouverture.

Conseils de conservation :

Conserver le gel pour gargarisme GeloTonsil® à moins de 25 °C.

Veillez conserver les dispositifs médicaux avec soin et hors de la portée des enfants !

IT Istruzioni per l'uso

GeloTonsil®

Gel per gargarismi

GeloTonsil® gel per gargarismi contiene: gomma xantana e sodio ialuronato

Sostanze ausiliarie: acqua depurata, xilitolo, dexpanthenolo, sodio fosfato dibasico, acido citrico, idrogeno perossido e sucralosio

Confezioni: 200 ml

Campo di applicazione:

GeloTonsil® gel per gargarismi serve alla terapia di supporto delle infiammazioni della mucosa orale e faringea. Il mal di gola e i disturbi della deglutizione vengono alleviati dopo che GeloTonsil® gel per gargarismi si è depositato come un film protettivo sulla mucosa della gola irritata.

Principio d'azione:

GeloTonsil® gel per gargarismi esercita un effetto di tipo fisico. Durante il gargarismo, il gel per gargarismi si deposita come un film protettivo sulle mucose della bocca e della gola idratandole. L'idratazione protegge la mucosa orale e faringea da disidratazione, irritazioni e influenze esterne in grado di causare mal di gola. La mucosa faringea irritata e infiammata viene lavata dall'uso di GeloTonsil® gel per gargarismi che rimuove meccanicamente gli agenti patogeni del mal di gola, in particolare i virus. Grazie ai componenti gelificanti (gomma xantana e acido ialuronico) si deposita sulla mucosa infiammata un film gel protettivo che la calma e la protegge da ulteriori influssi esterni. L'acido ialuronico contenuto in GeloTonsil® gel per gargarismi aumenta la capacità di ritenzione dell'umidità e potenzia l'adesione del film protettivo alle mucose. Inoltre, è contenuto dexpanthenolo come ingrediente curativo. Le aree irritate possono rigenerarsi nuovamente.

Controindicazioni e avvertenze:

GeloTonsil® gel per gargarismi non deve essere utilizzato in caso di nota allergia o ipersensibilità verso uno o più componenti del prodotto. Non usare GeloTonsil® gel per gargarismi in concomitanza con altri rimedi da usare in bocca e in gola. Usare GeloTonsil® gel per gargarismi solo se si è in grado di fare i gargarismi in modo sicuro. Va evitato qualsiasi contatto con gli occhi.

GeloTonsil® gel per gargarismi non contiene alcool ed è privo di componenti di origine animale.

Cosa bisogna tenere in considerazione nei bambini?

Non usare in bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini di età

pari o superiore a 3 anni devono utilizzare GeloTonsil® gel per gargarismi solo se sono in grado di fare i gargarismi in modo sicuro.

Gravidanza e allattamento:

GeloTonsil® gel per gargarismi può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Di cos'altro si deve tener conto per particolari categorie di pazienti?

GeloTonsil® gel per gargarismi è privo di zuccheri e adatto per persone con diabete.

Effetti collaterali:

Per GeloTonsil® gel per gargarismi non sono noti effetti collaterali.

Modalità e durata dell'assunzione:

Il gel per gargarismi GeloTonsil® è pronto all'uso e viene utilizzato non diluito per i gargarismi. Per il dosaggio utilizzare un cucchiaino. Fare i gargarismi con GeloTonsil® gel per gargarismi non diluito per circa 30 secondi. Quindi sputare GeloTonsil® gel per gargarismi e non risciacquare. L'ingestione involontaria di piccole quantità di GeloTonsil® gel per gargarismi è innocua.

Con quale frequenza si dovrebbe usare GeloTonsil® gel per gargarismi?

La quantità raccomandata per i gargarismi è 1 cucchiaino (10-15 ml) 3 volte al giorno. Evitare di mangiare o bere per circa un'ora dopo l'applicazione, in modo che il film protettivo aderisca in modo ottimale.

Per quanto tempo si può usare GeloTonsil® gel per gargarismi?

GeloTonsil® gel per gargarismi deve essere utilizzato per diversi giorni fino alla scomparsa dei disturbi. Se i disturbi acuti peggiorano (p. es. febbre, gonfiore della gola, dolore agli arti) o non migliorano entro 3 giorni, rivolgersi al medico.

Indicazioni e dati sulla validità:

Non usare più GeloTonsil® gel per gargarismi dopo la data di scadenza. Dopo l'apertura, usare GeloTonsil® gel per gargarismi per non più di 14 giorni.

Indicazioni per la conservazione:

GeloTonsil® gel per gargarismi deve essere conservato a una temperatura inferiore a 25 °C.

Conservare con cura i dispositivi medici! Conservare fuori dalla portata dei bambini!

 G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11
D-25551 Hohenlockstedt

CH REP

CH-Importeur:

Alpinamed AG

Alte Landstrasse 11, CH-9306 Freidorf
www.alpinamed.ch

LOT

Chargenbezeichnung
Número de lot
Identifi cativo del lotto



Verwendbar bis
À utiliser avant le
Consumare entro



25 °C
Unter 25 °C lagern
À conserver à une température inférieure à 25 °C
Conservare a temperatura inferiore a 25 °C



Hersteller
Fabricant
Fabricante



Gebrauchsanweisung beachten
Veillez suivre la notice d'instruction
Osservare le istruzioni per l'uso



Schweizer Bevollmächtigter
Mandatitaire suisse
Mandatario svizzero

Stand der Information: 2024-05

Mise à jour de l'information: 2024-05

Stato dell'informazione: 2024-05